

Tivra



Alta performance e amplo
espectro de controle
de fitopatógenos.

 forteagro

Tivra



Fungicida microbiológico de alta performance com excelentes resultados no controle dos principais fitopatógenos, contribuindo para uma drástica diminuição do inóculo dos patógenos, melhorando a performance das culturas.

Informações técnicas

Mecanismo de ação:

O Trichoderma controla os fitopatógenos por diferentes mecanismos de ação, parasitando e se alimentando dos nutrientes dos patógenos. Durante esse processo, são produzidas enzimas que danificam as paredes celulares, reduzindo a infecção e o inóculo e impedindo o desenvolvimento e crescimento dos patógenos. O Dermavale possui alta capacidade de parasitismo contra fungos fitopatogênicos, além de ser eficiente na promoção de crescimento e indução de mecanismos de defesa da planta.

Composição:

Trichoderma harzianum cepa IBLF1278.....6,0 g/L (0,06% v/v)
(contendo $3,5 \times 10^7$ UFC/mL de produto formulado)

Trichoderma harzianum cepa IBLF1282.....6,0 g/L (0,06% v/v)
(contendo $3,5 \times 10^7$ UFC/mL de produto formulado)

Trichoderma viride cepa IBLF1275.....6,0 g/L (0,06% v/v)
(contendo $3,5 \times 10^7$ UFC/mL de produto formulado)

Trichoderma viride cepa IBLF1276.....6,0 g/L (0,06% v/v)
(contendo $3,5 \times 10^7$ UFC/mL de produto formulado)

Outros ingredientes.....55,0 g/L (0,55%v/v)

Classe: Fungicida microbiológico

Tipo de Formulação: Suspensão concentrada (SC)

Concentração: $2,0 \times 10^7$ UFC/ml

Formulação: Concentrado Solúvel

Dose Produto: Comercial 0,5 a 1,0 l/ha

Características: Múltiplos mecanismos de ação | Tecnologia Fungo Ativo.

Tivra

Benefícios

Antibiose: produz enzimas tóxicas contra patógenos de solo;
Parasitismo: colonização e degradação enzimática dos fungos fitopatógenos;
Competição por espaço e recursos com os fitopatógenos;
Alta eficiência no controle de fitopatógenos do solo;
Atua em diferentes fases dos patógenos;
Melhora o desenvolvimento de plantas;
Indutor de resistência;
Menor risco dos patógenos adquirirem resistência;
Pode ser aplicado com umidades menores e temperaturas mais elevadas;
Facilidade operacional.

Alvos

Nome comum

Mofo-branco
Podridão-aquosa
Podridão-cinza-do-caule

Nome científico

Sclerotinia sclerotiorum
Rhizoctonia solani
Macrophomina phaseolina

Modo de Aplicação

Sulco de Plantio;
Corte de soqueira;
Pulverização;
Drench.

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária – MAPA sob nº 01823



 forteagro.agr.br

 **Uberlândia - MG**
Av. Nova York, Jardim - Novo Mundo, CEP: 38407-712

 **Palmas - TO**
Q. 412 Norte Al 2, 148 - Arne, CEP: 77006-540

(34) **9 9655-6665**

(34) **3235-9568**

ATENÇÃO!

Produto perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Leia e siga as instruções contidas em rótulos, Bulas e receitas. Utilize sempre equipamentos de proteção individual. Informe-se e realize o manejo integrado de pragas e o de resistência a doenças e plantas daninhas. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Venda sob receituário agrônômico. Descarte corretamente as embalagens e as sobras de produtos.